

АКРОБАТ® МЦ

Локально-системный фунгицид для борьбы с фитофторозом картофеля

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА

Действующие вещества	Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)
Препаративная форма	Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Культура	Картофель
Спектр действия	Фитофтороз
Норма расхода	2,0 кг/га
Применение	В период вегетации
Период защитного действия	10–14 суток
Срок ожидания (кратность обработки)	20 (3)
Упаковка	Мешки 1 x 10 кг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАСТЕНИИ

Диметоморф проникает в растительную ткань и распределяется в ней трансламнарно и акропетально, обеспечивая защиту всех частей растения, даже не покрытых обработкой.

Манкоцеб (контактный компонент препарата) дополнительно усиливает защитную функцию фунгицида, предотвращая прорастание спор грибов.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Диметоморф ингибирует формирование клеточных стенок гриба на всех стадиях их развития. Диметоморф убивает проникший в растение мицелий гриба в течение 1–2 суток после заражения. Это гарантирует успех в случае начавшегося, но не проявившегося внешне заболевания.

Действующее вещество манкоцеб является ингибитором нескольких ферментов гриба, поэтому возникновение резистентности по отношению к манкоцебу практически исключено.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ ФИТОФТОРОЗА**
- 2 ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ПАТОГЕНА**
- 3 ОТСУТСТВИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ**
- 4 АНТИСПОРООБРАЗУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ**

АКРОБАТ® МЦ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Первую профилактическую обработку как для контроля скрытой (латентной) инфекции фитофтороза, так и в целях достижения высокого защитного эффекта необходимо провести уже на ранних стадиях развития картофеля (до фазы смыкания ботвы в рядках). Дальнейшие обработки проводят с интервалом 10–14 дней в период активного роста растений.

При проведении последовательных обработок фунгицидами ОРВЕГО и АКРОБАТ МЦ наблюдается эффект пролонгированного действия диметоморфа в ботве картофеля. Диметоморф трансламинарно распределяется по листьям и стеблям растения, причем действующее вещество имеет период полураспада 14 дней. При проведении последовательных обработок фунгицидами ОРВЕГО и АКРОБАТ МЦ продолжительность действия и фунгицидный эффект от диметоморфа усиливаются.

АКРОБАТ®
МЦ

2,0 кг/га (макс. 3 обработки)

