

ФУНГИЦИД

Либертадор®

Стратегии применения

avgust 
crop protection

- 1.** Опрыскивание в период остановки активного роста ботвы и наступления благоприятных условий для развития фитофтороза (обычно от цветения - роста клубней и вплоть до уборки, в первую очередь для завершающих обработок).
- 2.** Опрыскивание в любой период, когда возникает вспышка фитофтороза. Для этого Либертадор необходимо добавить к системному или трансламинарному препарату (Инсайд, Метаксил, Ордан и др.)

Применение Либертадора в системе фунгицидной защиты картофеля по вегетации




Схема защиты картофеля	15	19	51	55 - 59	59 - 65	69 - 89	91 - 93
Вредный объект, назначение	Высота ботвы 5 см	Высота ботвы 15 см	Развитие листьев	Бутонизация	Цветение	Созревание	Увядание или совместно с десикацией
Фитофтороз. Базовая схема защиты		Метаксил®, 2,5 кг/га	Инсайд®, 1 л/га	Инсайд®, 1 л/га	Либертадор®, 0,5 л/га	Талант®, 3 л/га	
Фитофтороз. В случае благоприятных погодных условий для развития болезни	Талант®, 2,5 л/га	Либертадор®, 0,3 л/га + Метаксил®, 2,5 кг/га	Метаксил®, 2,5 кг/га	Инсайд®, 1 л/га	Инсайд®, 1 л/га	Либертадор®, 0,5 л/га	Либертадор®, 0,4 л/га
Альтернариоз (в засушливых условиях). В дополнение к базовой схеме от фитофтороза		Раёк®, 0,4 л/га		Тирада®, 3,3 л/га		Раёк®, 0,4 л/га	
Альтернариоз (во влажные годы). В дополнение к базовой схеме от фитофтороза				Раёк®, 0,4 л/га	Раёк® 0,4 л/га		