

Скарабей®

Механизм действия

Дифлубензурон обладает контактным и кишечным действием, нарушает процессы линьки у вредных насекомых. Не действует на имаго, но нарушает развитие яиц и личинок. Максимальный овицидный эффект наблюдается при откладке самками яиц на обработанные растения.

Эсфенвалерат обладает контактно-кишечным действием, воздействует на нервную систему насекомых. Проявляет также репеллентный эффект



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Скорость воздействия

avgust 
crop protection

**Начинает действовать через 30 мин
после обработки**



ИНСЕКТИЦИД

Скарабей®

Период защитного
действия

**14 суток и более,
в зависимости от
погодных условий
и численности
вредителей**



Скарабей®

Регламенты применения

| Культура | Способ и сроки обработки | Норма расхода препарата, л/га |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Яблоня, груша, айва | Яблонная плодожорка, листовертки | 0,35 - 0,7 |
| Виноград | Гроздевая листовертка | 0,3 - 0,6 |
| Капуста белокочанная и цветная | Капустная моль, капустная совка | 0,2 - 0,4 |
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,2 |