

Пилот®

спектр действия

Чувствительны:

- вероника (виды)
- галинсога мелкоцветная
- горец (виды)
- горчица полевая
- гулявник (виды)
- дескурайния Софии
- дымянка аптечная
- звездчатка средняя
- капуста полевая
- кохия веничная
- крестовник обыкновенный
- лебеда (виды)
- марь (виды)
- пастушья сумка
- паслен черный
- пикульник (виды)
- подмаренник цепкий
- портулак огородный
- ромашка (виды)
- редька дикая
- росичка кроваво-красная
- трехреберник
- щирица (виды)
- яснотка пурпуровая
- ярутка полевая
- фиалка полевая
- просо куриное

Пилот[®]

механизм действия

- метамитрон относится к классу 1,2,3-триазинонов
- обладает системным действием
- подавляет однолетние двудольные сорняки на ранней стадии их развития
- проникает через корень и листья
- блокирует фотосинтез сорных растений

Пилот®

СИМПТОМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ



Пилот®

скорость воздействия

При довсходовом применении:

сорняки погибают в момент прорастания

При послевсходовом применении:

сорняки погибают в течение нескольких недель после обработки

Гербицид проникает в сорные растения преимущественно через корни, поэтому позволяет задержать появление второй «волны» сорняков